



¿Qué es una convulsión febril?

Es una respuesta del cerebro ante la fiebre que se produce en algunos niños sanos entre los 6 meses y los 5 años de edad. Casi siempre ocurren en los dos primeros días de fiebre.

Causas



Desconocida
Cualquier infección vírica
banal con fiebre puede
desencadenarla

Frecuencia



Son frecuentes: de 3 a 5 niños
de cada 100 las padecen

1 de cada 3 niños tienen más
episodios

Duración



Suele durar poco tiempo
(menos de 5 min)
y se soluciona sola



Pérdida de
conciencia

Rigidez

Sacudidas rítmicas o
flacidez total

¿Cuáles son los síntomas?

Boca morada y
cerrada fuerte

Mirada perdida
Ojos en blanco

Vómito o micción
involuntaria



**Por muy alarmantes que parezcan,
generalmente no ocasionan problemas neurológicos posteriores
ni mayor riesgo de epilepsia**



Qué HACER y NO HACER en casa



Mantén la calma




Mide la duración
de la convulsión



Colócalo en posición lateral
para que respire mejor



Lejos de objetos con los que
pueda golpearse



Acude al centro sanitario más cercano
para valoración médica



No realizar respiración artificial, ni
sacudir, golpear o detener los
movimientos del niño



No meterle los dedos en la boca
ni intentar abrirla
¡Tranquilo/a! No se “tragará” la lengua